


















	= Postero-anteriort over 3 processi spinosi	(flad hånd)
	= Postero-anteriort centralt vertebralt pres	(PA's)
	= Antero-posteriort centralt vertebralt pres	(AP's)
	= Postero-anteriort unilateralt vertebralt pres	(Pt's ⊙ side)
	= A/A henholdsvis i medial og lateral retning	(Pt's ⊙ side)
	= PA unilateralt pres på arcus posterior C1	(Pt's ⊙ side)
	= Antero-posteriort unilateralt vertebralt pres	(Pt's ⊕ side)
	= Postero-anteriort unilateralt pres på ribben	(Pt's ⊙ side)
	= Transverselt vertebralt pres.	(mod højre)
	= Rotation af hovedet eller pelvis	(til højre)
	= Lateral Flexion	(til højre)
	= Longitudinel mobilisering	
	= Longitudinel compression	
	= Rotation \bar{c} SLR	
	= medial rotation.	
	= lateral rotation	
	= mobilisering af ilium \bar{c} sacrum fixeret	
	= mobilisering af ilium og sacrum samtidigt	
	= forlæns rotation af ilium	
	= baglæns rotation af ilium	



Symboler og forkortelser

5,00 B

Sammenhæng mellem "normale" bogstaver / tal og FYSIO-fonten
(Fonten FYSIO kan hentes fra www.muskuloskeletal.dk)

a	
b	
c	
d	
e	
f	
g	
h	
i	
j	
k	
l	
m	
n	
o	
p	
q	
r	
s	
t	
u	
v	
w	

x	
y	
z	
1	①
2	②
3	③
4	④
5	⑤
6	⑥
7	⑦
8	⑧
9	⑨
0	⑩
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	
H	Ⓜ

I	
J	
K	
L	Ⓛ
M	
N	
O	
P	
Q	
R	Ⓜ
S	Ⓢ
T	
U	
V	Ⓥ
W	
X	
Y	∴
Z	∴



A/A = S/O	= As Above = som ovenfor	G.H.= alm t.	= Generel helbredstilstand
Ab	= abduktion	G/H	= Glenohumeral led
A/C	= Acromio Claviculær led	gent.= rep.	= gentag = repetere
Ad	= adduktion	gradv.	= gradvist
Adversus	= imod, ugunstig	HBB	= "hand behind back"
A/H	= Acromio Humeral led	HE	= horizontal extension
Alb	= Albuen	HF	= horizontal fleksion
ANT	= abnorm nerve tension	H&N	= hoste og nys
ant.	= anteriort	Hoft.	= hofte
B	= bedre	HP	= hovedpine
⊕	= Centralt	⊕ = ⊗	= højre = right.
Cx	= Columna Cervicalis	i.e.	= id est = det er
C̄ = cum	= med	id.	= idem = det samme
Ca	= Carpus	ILA	= inferiore laterale angle
Cal/Ta	= Calcaneo Talare	inf.	= inferiort
Ca/metcarp	= Carpo metacarpalled	int.	= intermitterende
caud.	= caudalt	int.Ca	= inter carpalt
ceph.	= cephalad	inst.	= instabil
cf.	= conferre = sammenlignet med	Inv.	= inversion
C/O	= complaint of = anamnese	ISQ	= in status quo = uændret
compr.	= kompression	K	= knæ
cran.	= cranialt	konst.	= konstant
Cx F	= cervical fleksion	Kr.	= kraft
Cx T	= cervical traktion	L	= limit = Stop
Dors.	= dorsalt	l	= lokal (f.eks.: l P = lokal smerte)
De	= depression = sænkning	Lx	= columna lumbalis
DF	= dorsal fleksion	lat	= lateralt
dist.	= distalt	lat F	= lateral fleksion
distr.	= distraktion	lat shift	= lateral forskydning
E	= extension	LCQ	= lav cervical quadrant
E/Ab	= extension/abduktion	lock	= låsnings stilling
E/Ad	= extension/adduktion	Lx Q	= lumbal quadrant
e.g. = fx.	= eksempel gratia = for eksempel	Lx T	= lumbal traktion
EIL	= extension i liggende	mag	= magnum = stor
EIS	= extension i stående	Mb	= morbus = sygdom
EISid	= extension i siddende	med	= medialt
EI	= elevation	Min	= minimal
EOR	= end of range = yderstilling	mod	= moderat
EORP	= end of range pain	MR	= mid range = midt bane
ER	= early range = inderbane	NB	= notabene
Ev	= eversion	N/E	= no effect, ingen effekt
F	= fleksion	neur.	= neurologisk
F/Ab	= fleksion/abduktion	neur.	= neutral
F/Ad	= fleksion/adduktion	nil	= intet
fam. disp.	= familiær disposition	NK	= nil kendt = ved ikke
FIL	= fleksion i liggende	non	= ingen
FIS	= fleksion i stående	NT	= nil testet = ikke undersøgt
FISid	= fleksion i siddende	N	= nature



Symboler og forkortelser

5,02 A

Obs	= observer	SIPS	= Spina Iliaca posterior superior
occ	= occasional = af og til	Sk.	= skulderbæltet
O/E	= on examination	SLR	= Strakt ben løft
OP	= overpres	SMP	= sympaticus maintained pain
Ops	= operationer	s.o.s.	= si opus sit = om nødvendigt
osc	= oscillationer	spon.	= spontant = akut
P	= pain = smerte	S&S	= signs and symptoms
P/E	= physical examination	subta.	= subtalare led
Px	= I prescribe = jeg ordinerer	sup.	= superior
PAM	= passive accessory movements	Sup.	= Supination
PAIVM	= passive accessory intervertebral movements	sust.	= sustained = vedvarende
PBTT	= plexus brachialis tension test	symf.	= symfyssen
PDM	= pain during movement	Tx	= Thoracal columna
P/E	= funktions undersøgelser	Ta/Cr.	= Talo Crural led
PF	= plantar fleksion	Tars	= Tarsus
P/F	= patello femoral led	T/F	= Tibio femoral led
PKF	= passiv knæ fleksion	Tib/Fib	= Tibio fibular led
PNF	= passiv nakke fleksion	Tin.	= Tinnitus
P&N	= pins & needles = paræstesier	TP	= Terapeut
post.	= posterior	TxT	= Thoracal traktion
PP	= present pain	UCxQ	= Øvre cervical quadrant
PPIVM	= passive physiological intervertebral movements	U/H	= Ulna Humeral led
PPM	= passive physiological movement	ULNT	= upper limp nerve test
Pr	= protraktion	ULTT	= upper limp tension test
Pro	= pronation	⊖ = ⊕	= venstre = left
prox.	= proximalt	V	= Værre
PT = Pt	= patient	Ventr.	= ventral
Q	= quadrant	W	= Warn = adv.
R	= resistance = modstand	∴	= på grund af
Rx	= recipe = jeg ordinerer	∴	= derfor
R/An	= Radio anulare led	>	= større end
R/Ca	= Radio Carpal led	>>	= meget større end
Refl.	= reflekser	<	= mindre end
R/H	= Radio Humeral led	<<	= meget mindre end
ROM	= range of movement = udslag	≥	= større end eller lig med
rot.	= rotation	≤	= mindre end eller lig med
rtg.	= røntgen	≠	= forskellig fra
R/U	= Radio Ulnar led	≈	= svarer til
S	= Spasme	Δ	= diagnose
Sx	= symptomer	√	= i orden = ok
̄	= sine = uden	+tiv = +ve	= positiv
S/A	= See again = ses igen	-tiv = -ve	= negativ
S/C	= Sterno Claviculær led	↑	= øges
Sens.	= sensibilitet	↓	= mindskes
severus	= streng, hård	1/7	= 1 dag
SGIS	= sideglidning i stående	1/12	= 1 mdr. = 1 måned
SI	= Sacro Iliaca led	1/24	= 1 time
SIAS	= Spina iliaca anterior superior	1/52	= 1 uge
SIN	= severity, Irritability, Nature	1/60	= 1 = 1 min. = 1 minut
		30'	= 30 sek. = 30 sekunder
			= behandlingseffekt